



Suvirapsi väetamisprogramm



Koos külviga

BBCH 14-25
4.-8. lehe
faas, leheroseti
moodustumine

BBCH 30-33
Varsumine

BBCH 30-39
Varsumine

BBCH 55-59
Õiepungade
moodustumise faas

YaraMila[®]

NPK(S)*
17-11-12-(10), B, Mg
300-400 kg/ha

YaraBela[®]

SULFAN 24N-6S
200-300 kg/ha

SULFAN 24N-6S
100-200 kg/ha

YaraVita[®]

BRASSITREL PRO
1,0 l/ha
+
BORTRAC 150
1,0 l/ha

BRASSITREL PRO
1,5 l/ha
+
BORTRAC 150
1,5 l/ha

THIOTRAC
3,0-5,0 l/ha

YaraLiva[®]

NITRABOR**
200-300 kg/ha

* või **YaraMila NPK(S) 18-11-13-(7), B, Mg** või **YaraMila NPK(S) 8-24-24-(7), B** või **YaraMila NPK(S) 20-5-15-(5), B** või **YaraMila NPK(S) 9-12-25-(7), B, Mg** või **YaraMila NPK(S) 7-20-28-(8), B, Mg** või **YaraMila NPK(S) 21-6-12-(9), B, Mg**.

** väga kiireks kaltsiumi, boori ja lämmastiku omastamiseks rapsi aktiivse kasvu faasis, samuti stressi (põua) tingimustes.

■ Mulda viidav väetis

■ Leheväetis

Kontrollige YaraVita paagisegu kokkusobivust teiste YaraVita toodete ja taimekaitsevahenditega veebilehelt www.tankmix.com või mobiilirakenduses TankmixIT. Enne YaraVita leheväetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett.

Tähelepanu! Ülaltoodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara põldkatsete tulemustel.