



Knowledge grows

Avamaa köögiviljade väetamisprogrammid

		Enne külvamist või istutamist	Täiendav väetamine mulla kaudu		Lehekaudne väetamine***						
		YaraMila® COMPLEX 12-11-18 arba CROPCARE 11-11-21	YaraLiva® TROPICOTE	YaraLiva® NITRABOR	YaraTera® KRISTALON 13-40-13 YELLOW 3 kg/ha	YaraVita® BRASSITREL PRO 3 l/ha	YaraTera® KRISTALON 18-18-18 SPECIAL 3 kg/ha	YaraTera® KRISTALON 12-12-36 RED 3 kg/ha	YaraTera® CALCINIT 5 kg/ha	YaraTera® TENSO COCKTAIL** 0,5 kg/ha	YaraVita® MANTRAC PRO 0,5 l/ha
	Lillkapsas	600* kg/ha	250 kg/ha 2-3 näd. pärast külvamist	250 kg/ha 4-5 näd. pärast külvamist	Varsti pärast tärkamist	Alates 3-4 näd. pärast tärkamist	1-2 x intensiivse lehekasvu ajal	Pea kasvamise ajal 2 x iga 10 päeva järel, vaheldumisi CALCINIT'iga	Roseti moodustumise ajal 2-6 x iga 10 päeva järel	Profülaktiliselt mikrotoitainete puuduste ennetamiseks	-
	Brokoli	500* kg/ha	200 kg/ha 2-3 näd. pärast külvamist	200 kg/ha 4-5 näd. pärast külvamist	Varsti pärast tärkamist	Alates 3-4 näd. pärast tärkamist	1-2 x intensiivse lehekasvu ajal	Pea kasvamise ajal 2 x iga 10 päeva järel, vaheldumisi CALCINIT'iga	Rosettide moodustumise ajal 2-6 x iga 10 päeva järel	Profülaktiliselt mikrotoitainete puuduste ennetamiseks	-
	Peakapsas	600* kg/ha	150 kg/ha 3 näd. pärast külvamist	2 x 150 kg/ha 5 ja 7 näd. pärast külvamist	Varsti pärast tärkamist	Alates 3-4 näd. pärast tärkamist	1-2 x intensiivse lehekasvu ajal	Alates 20%-lisest pea suuruselt 3 x iga 5-7 päeva järel, vaheldumisi CALCINIT'iga	Alates 20%-lisest pea suuruselt 3 x iga 5-7 päeva järel	Profülaktiliselt mikrotoitainete puuduste ennetamiseks	Pärast reavahede harimist
	Hiina kapsas	500-700 kg/ha	-	2 x 150-200 kg/ha 3 ja 5 näd. pärast külvamist	Varsti pärast tärkamist	Alates 3 näd. pärast tärkamist	1-2 x intensiivse lehekasvu ajal	-	4 näd. pärast tärkamist 5-6 x iga nädal	Profülaktiliselt mikrotoitainete puuduste ennetamiseks	5 näd. pärast istutamist
	Porgand	550-800 kg/ha	150-250 kg/ha 4-6 pärislehe faasis	-	2-3 pärislehe faasis	4-6 pärislehe faasis	1-2 x intensiivse lehekasvu ajal	10 lehest 2 x iga 10-14 päeva järel	-	Profülaktiliselt mikrotoitainete puuduste ennetamiseks	-
	Petersell	550-650 kg/ha	150-250 kg/ha 4-6 pärislehe faasis	-	2-3 pärislehe faasis	4-6 pärislehe faasis	1-2 x intensiivse lehekasvu ajal	10 lehest 2 x iga 10-14 päeva järel	-	Profülaktiliselt mikrotoitainete puuduste ennetamiseks	-
	Porrulauk	600 kg/ha	200 kg/ha 4-5 näd. pärast külvamist	2 x 150-200 kg/ha 2-3 ja 6-7 näd. pärast külvamist	Varsti pärast tärkamist	4-5 näd. pärast tärkamist	1-2 x intensiivse lehekasvu ajal	Varre laienedes 2 x iga 10-14 päeva järel	Kui leheotsad hakkavad kollaseks muutuma	Profülaktiliselt mikrotoitainete puuduste ennetamiseks	Pärast 7. pärislehte
	Seller	600* kg/ha	150-200 kg/ha 3 näd. pärast külvamist	150-200 kg/ha 4-5 näd. pärast külvamist	Varsti pärast tärkamist	4-5 näd. pärast tärkamist	1-2 x intensiivse lehekasvu ajal	Juurte kasvu ajal 3 x iga 2 näd. järel, vaheldumisi CALCINIT'iga	Juurte kasvu ajal 3 x iga 2 näd. järel	Profülaktiliselt mikrotoitainete puuduste ennetamiseks	-
	Punapeet	600* kg/ha	-	2 x 150-200 kg/ha 2 näd. pärast tärkamist ja 4 näd. hiljem	2-3 pärislehe faasis	6 näd. pärast tärkamist	1-2 x intensiivse lehekasvu ajal	Juurikate valmimise ajal	-	Profülaktiliselt mikrotoitainete puuduste ennetamiseks	7 näd. pärast tärkamist

* Kõigile ristõielistele (v.a hiina kapsas), peedile ja sellerile võib anda lisaks ka **YaraMila NPK(S) 7-20-28(8)** 200 kg (brokoli) ja 250 kg (lillkapsas, peakapsas, peet ja seller).

** Madala ja väga madala kaaliumisisaldusega muldade puhul lisage enne istutamist või külvil kevadel granuleeritud kujul kaaliumsulfaati 50 - 100 kg/ha või sügisel kaaliumkloriidi.

Eriti oluline on seda kasutada kõrge pH tasemega muldale; 2-3 korda hooajal, sobib kasutamiseks koos **YaraTera CALCINIT**'iga.

*** Lehekaudset väetamist ei tohiks teha intensiivse päikese käes, eriti kõrgete või väga madalate temperatuuride korral ega närbumisnähtudega taimedele.

Valige vee kogus vastavalt lehtede arvule ja suurusle ning taimede arvule ha kohta.

Mulda viidav väetis

Leheväetis

Ettevaatust! Programmis toodud kulunormid on vaid soovituslikud ja neid tuleks kohandada vastavalt mulla- ja taimeanalüüside põhjal. Väetamisel tuleb arvestada ilmastikuolude ja taimiku seisukorraga.

Pidage meeles, et kõrgeid köögiviljasaake on võimalik saada hästi haritud muldadel ja tugeva agronoomilise taustaga.