

# Talinisu väetamisprogramm

							
	Koos külviga	BBCH 12-21 Alates 2. lehe faasist		BBCH 21-29 Võrsumisfaas	BBCH 30-32 Kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlmeni	BBCH 37-42 Lipulehe ilmumisest kuni viljatupp on pikenenud	BBCH 51-79 Loomisfaasist kuni piimküpsuseni
<b>YaraMila®</b>	NPK(S)* 9-12-25-(7), B, Mg 200-300 kg/ha			NPK(S)* 18-11-13-(7), B, Mg 170-200 kg/ha või NPK(S) 20-5-15-(5), B 170-200 kg/ha			
<b>YaraBela®</b>				AXAN** 27N-4S 200-250 kg/ha	AXAN** 27N-4S 200-250 kg/ha	AXAN** 27N-4S 100-150 kg/ha	
<b>YaraVita®</b>		GRAMITREL 1,0 l/ha ja/või KOMBIPHOS 2,0-3,0 l/ha		GRAMITREL 1,0 l/ha ja/või KOMBIPHOS 2,0-5,0 l/ha***	GRAMITREL 1,0-2,0 l/ha	UNIVERSAL BIO 1,0-2,0 l/ha	THIOTRAC 3,0-5,0 l/ha
<b>YaraTera®</b>						KRISTALON™ 20-20-20 3,0-5,0 kg/ha	

\* Või **YaraMila NPK(S) 20-5-15-(5), B** või **NPK(S) 8-24-24-(7), B** või **NPK(S) 18-11-13-(7), B, Mg** või **NPK(S) 17-11-12-(10), B, Mg** või **NPK(S) 7-20-28-(8), B, Mg**.

\*\* Või **YaraBela SULFAN 24N-6S**.

\*\*\* **YaraVita KOMBIPHOS**’i kasutada madala fosforisisaldusega muldade puhul või siis, kui fosfori omastamine taimede poolt mullast on häiritud.

Kontrollige YaraVita paagisegu kokkusobivust teiste YaraVita toodete ja taimekaitsevahenditega veebilehelt [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) või mobiilirakenduses TankmixIT. Enne YaraVita leheväetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett.

**Tähelepanu!** Üllalloodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara põldkatsete tulemustel.

■ Mulda viidav väetis

■ Leheväetis